

QUÈ CAL FER DAVANT UN RESULTAT NEGATIU PER A EGB?

Realitzar mesures higièniques per evitar que el resultat es converteixi a positiu:

- Rentat freqüent de mans (més de 3 vegades al dia)
- Rentat de mans abans i després d'anar al lavabo
- Higiene dels genitals un cop al dia i rentar i eixugar els genitals en direcció de vulva cap anus. S'ha d'evitar la direcció d'anus cap vulva o en els dos sentits.



PREGUNTA A LA TEVA LLEVADORA

Font:

Francés Ribera, L. *Factors de risc associats a la colonització per *Streptococ* del grup B durant la gestació* [tesi doctoral]. Barcelona. Universitat de Barcelona; 2017.

Disponible a: <http://hdl.handle.net/10803/404727>



ESTREPTOCOC GRUP B DURANT L'EMBARÀS



Associació
Catalana
de Llevadores

QUÈ ÉS L'ESTREPTOCOCC DEL GRUP B (EGB)?

És un bacteri que forma part normalment de l'estómac i els budells i per proximitat pot arribar als genitals de dones sanes de totes les ètnies.

En general, l'EGB no és perjudicial per a la dona ni presentarà símptomes.

L'EGB adquireix especial rellevància durant la gestació per la possibilitat de transmissió al nadó al seu pas pel canal del part.

COM ES DETECTA L'EGB DURANT L'EMBARÀS?

El mètode més eficaç per a la detecció de l'EGB, consisteix en la realització d'un cultiu de la vagina i de recte a totes les embarassades entre les setmanes 35 i 37 de la gestació.

Aquesta prova és de fàcil realització, no ocasiona molèsties i no té cap risc per a l'embaràs.

El resultat (positiu o negatiu) se li comenta a la dona i s'anota en la història clínica.

Aquest cultiu s'ha de realitzar en cada embaràs

QUÈ SIGNIFICA PRESENTAR EL RESULTAT DEL CULTIU POSITIU PER A EGB?

En el nostre context el 13,5% de les embarassades presenten el resultat positiu.

Això no vol dir que l'embarassada tingui una infecció, sinó que té l'EGB en l'organisme (en vagina o recte) i el nadó té risc d'infectar-se durant el part.

QUINS FACTORS PODEN AFAVORIR TENIR AQUEST BACTERI?

Haver tingut l'EGB positiu en una gestació prèvia.

Presentar una infecció d'orina en el primer trimestre de la gestació actual.

Ser una dona jove (menys de 32 anys).

Haver parit dues o més vegades (ser multipara).

Rentar-se les mans poques vegades al dia (2 cops o menys)

Realitzar la higiene dels genitals de forma incorrecta, en direcció d'anus cap vulva o en els dos sentits.

QUÈ CAL FER DAVANT UN RESULTAT POSITIU PER A EGB?

Continuar amb el control de l'embaràs normal i quan la dona estigui en treball de part, se li administraran antibiòtics (penicil·lina o ampicil·lina) per via intravenosa per ajudar a protegir el nadó de la infecció, com a mínim 4 hores abans del naixement.

Prendre antibiòtic abans del part no ajuda a prevenir la infecció en el nadó, ja que aquest bacteri pot tornar a reproduir-se

